

KÚFSKEL – OCEAN QUAHOG

Arctica islandica

RÁÐGJÖF – ADVICE



Hafrannsóknastofnun ráðleggur í samræmi við varúðarsjónarmið að afli fiskveiðiárið 2018/2019 verði ekki meiri en 100 tonn, nema að undangengnum rannsóknum á þéttleika skeljar á fyrirhuguðum veiðisvæðum.

MFRI advises that when the precautionary approach is applied, catches in the fishing year 2018/2019 should not exceed 100 tonnes, unless research on ocean quahog density on the intended fishing grounds is carried out prior to harvesting.

VEIÐAR – THE FISHERY

Veiðar á kúfskel voru stundaðar með hléum árin 1988–1999 á svæðinu frá Breiðafirði að Skagatá. Landaður afli var á bilinu 1100–7700 tonn. Veiðar á svæðinu frá Skagatá austur um að Ingólfshöfða hófust 1996 og var afli til ársins 2005 á bilinu 700–14400 tonn. Veiðar hafa verið óverulegar frá 2009 vegna markaðsaðstæðna. Árið 2009 lögðust allar veiðar með vatnsprýstiplógi af, en í staðinn hefur verið notaður lítill tannplógur og hefur aflinn verið á bilinu 1–30 tonn.

Fishery for ocean quahog was conducted intermittently in NW Iceland in 1988–1999. Landings ranged from 1100–7700 tonnes annually. Fishery in the NE area started in 1996 and yielded 700–14400 tonnes annually until 2005. Since 2009, only a minor fishery has been conducted due to difficult markets. In 2009, hydraulic dredge fishing ceased, being replaced by dry dredge fishery taking 1–30 tonnes annually.



Kúfskel. Afli eftir svæðum og veiðisvæði árin 2000–2009.

Ocean quahog. Catches by area, and fishing grounds in 2000–2009.

AÐRAR UPPLÝSINGAR – OTHER INFORMATION

Kúfskel er langlíf og hægvaxta tegund og því þarf að fara varlega við nýtingu hennar.

Ocean quahog is a long-lived and slow-growing species and is therefore vulnerable to heavy exploitation.