

VÍÐIDALSÁ 1986 OG 1987

Tumi Tómasson

Hólum, maí 1988

VMST-N/88010X



VEIÐIMÁLASTOFNUN - NORDURLANDSDEILD
Hólum, Hjaltadal, 551 Sauðárkróki.

VÍÐIDALSÁ 1986 OG 1987

INNGANGUR

Frá árinu 1984 hafa verið gerðar reglulegar og kerfisbundnar athuganir á seiðastofnum Víðidalsár og Fitjár, og uppruni laxa í veiði áætlaður með hliðsjón af greiningu hreistursýna. Gerð hefur verið ítarleg grein fyrir niðurstöðunum 1984 (Tumi Tómasson og Finnur Garðarsson 1984) og 1985 (Tumi Tómasson 1986), en einungis gerð grein fyrir helstu niðurstöðum athugananna 1986, og engin gögn kynnt (Tumi Tómasson 1987). Í þessari skýrslu er ætlunin að gera nánari grein fyrir niðurstöðum athugananna 1986, auk þess sem greint verður frá athugunum 1987.

Sumarið 1986 var haldið áfram tilraunum með mismunandi sleppitíma smáseiða sem hófust 1985. Rafveiðarnar voru framkvæmdar 28/7-2/8 á alls 24 stöðum. Sumarið 1987 var rafveitt 16-24/8 aftur á 24 stöðum, og eins og undanfarandi ár sá Veiðimálastofnun um smáseiðasleppingar á svæðinu. Leitast er við að rafveiða á sem næst sömu stöðum milli ára og eru rafveiðistaðirnir merktir inn á kort (Mynd 1).

ÁSTAND SEIÐASTOFNA

Þessum athugunum má skipta í tvennt. Annars vegar er athugaður vöxtur og útbreiðsla náttúrulegra seiða, þ.e. seiða sem klakist hafa út í ánni. Hinsvegar athuguð afkoma seiða sem sleppt hefur verið á ólaxgeng svæði. Sleppiseiðin hafa ávalt verið af stofni árinna og hafa frá 1981 verið alin í eldisstöð Hólalax h.f. sem veiðifélagið er hluthafi að.

Náttúrulegir seiðastofnar

Eins og fram hefur komið má oft rekja sveiflur í laxgengd til ástands náttúrulegra seiðastofna, þó þar gæti sjávarþátturinn einnig valdið miklu um. Þetta er raunar vandamál sem reynt er að rannsaka ítarlega þessi árin.

Það eru einkum þrír þættir sem hafa áhrif á afkomu seiðanna, þ.e. botngerð, hitafar og seiðapéttleiki, en þessir þættir til samans ákvarða vaxtarskilyrði seiðanna. Afföll seiða eru oftast í öfugu hlutfalli við vaxtarskilyrði. Áhrif botngerðar og hitafars eru því meiri sem péttleiki seiðanna er meiri. Það er erfitt að hafa áhrif á nokkurn þessara þátta, en það má þó reyna það, t.d. með vatnsmiðlun, grjótburði og stjórnum veiðiálags.

Athuganir á seiðastofnum á laxgengum svæðum segja okkur hvort óhætt sé að auka veiðiálagið, hvort staðbundinn seiðaskortur sé í ánni og hvort við getum vinst að laxgengd í ána fari vaxandi eða dragist saman.

Auk þessa safnast gögn um þróun ástandsins til lengri tíma, gögn sem eru og geta orðið undirstaðan að ákvarðanatöku um margs-konar ræktunarframkvæmdir. Enn sem komið er, er helsti tilgangur rafveiða á laxgengum svæðum þó að fylgjast með og skrá athuganirnar. Niðurstöðurnar eru lítið notaðar, nema þá helst óbeint, enda lítið svigrúm til að breyta nýtingarformi í samræmi við ástandið á hverjum tíma.

Á Myndum 2-5 er sýnd lengdar- og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Víðidalsá og Fitjá 1986 og 1987. Staðir 1-4 í Víðidalsá eru á ólaxgengum svæðum, en á öllum öðrum stöðum er eingöngu um náttúruleg seiði að ræða.

Þar sem ekki hefur verið veitt á nákvæmlega sömu tímum frá ári til árs er oft erfitt að gera sér nákvæma grein fyrir breytingum á vexti seiða milli ára. Þó er ljóst að vöxtur náttúrulegra seiða í Víðidalsá hefur batnað verulega síðan 1984, og seiði ganga nú almennt út eftir þriggja og aðallega fjögurra ára dvöl í ferskvatni í stað fjögurra og fimm ára áður. Vöxtur virðist heldur hafa batnað milli ára 1986 og 1987 (Myndir 2 og 3).

Svæðin sem eru rafveidd eru misstór, og til að fá sem raunhæfastan mælikvarða á breytingu í þéttleika hafa tölur um veiði verið umreiknaðar í fjölda seiða á hverja 100 m. Það gerir samanburðinn eitthvað óöruggan að veiðni getur verið breytileg á milli staða og ára, en þó á að vera hægt að treysta því að hægt sé að segja til um í hvaða átt breytingar verða þótt ekki sé nákvæmlega hægt að setja tölu á stærð þeirra. Í Töflum 1 og 2 eru settar fram niðurstöður rafveiða í Víðidalsá 1986 og 1987.

Tafla 1. Fjöldi veiddra laxaseiða af mismunandi árgöngum í rafveiðum í Víðidalsá 28/7-2/8 1986. Staðirnir eru merktir inn á kort (Mynd 1).

Staður	Stærð	fjöldi veiddra seiða á 100 m			
	m	0+	1+	2+	3+/4+
1	600	5.0	3.7	0.3	-
2	600	6.2	2.7	2.7	-
3	600	1.8	7.3	1.5	-
4	600	4.8	4.8	0.8	-
5	450	1.1	10.9	5.6	3.5
6	480	0.4	6.2	5.2	1.2
7	200	1.0	9.2	2.5	0.5
8	585	1.4	13.2	2.6	2.7
9	420	-	5.7	0.9	-
10	495	-	8.9	1.8	2.8

Tafla 2. Fjöldi veiddra laxaseiða af mismunandi aldri í Víðidalsá 16-24/8 1987. Staðirnir eru merktir inn á kort (Mynd 1).

Staður	Stærð m	fjöldi veiddra seiða á 100 m			
		0+	1+	2+	3+/4+
1	55x10	2.4	4.4	0.7	-
2	40x15	4.2	4.2	2.0	-
3	50x10	1.8	3.0	2.6	-
4	50x10	4.8	2.4	0.2	-
5	25x12	-	9.7	12.0	2.3
6	40x10	5.7	5.5	1.7	0.5
7	40x5	0.5	11.0	9.5	2.0
8	40x12	2.1	3.5	6.5	0.6
9	30x12	7.5	3.3	1.9	-
10	25x11	1.8	4.7	5.1	1.1

Árið 1984 var hlutfall stórra seiða (2+/3+) í veiðinni hátt, sem benti til að gönguseiðaframleiðslan 1985 yrði góð. Þetta stóðst, og kom fram í góðri smálaxaveiði 1986. Gera má ráð fyrir að gönguseiðaframleiðsla hafi heldur minnkað vorið 1986 en þó verið góð og einnig má reikna með að framleiðslan vorið 1987 hafi verið góð. Nú í vor bendir flest til að framleiðslan minnki heldur, en það fer þó eftir árferði.

Eins og fram kom var 1984 árgangurinn (1+ 1986, 2+ 1987) sterkur og fer það eftir hve hátt hlutfall af honum fer út í vor hver útkoman verður. Reikna má með að stór hluti þess árgangs haldi þó ekki út fyrr en vorið 1989, og að smálaxagengd aukist þá aftur 1990. Ekki er þó fyrirsjáanleg nein lægð í laxgengd.

Stærð og dreifing 0+ og 1+ seiða í Víðidalsá 1987 var með eðlilegum hætti og fjöldi þeirra virðist mátulegur.

Í Fitjá var mikið af stórum seiðum 1984 og 1985, en heldur dró úr þéttleika þeirra 1986 (Tafla 3). Þá bar hinsvegar mikið á 1+ seiðum. Í veiðunum 1987 var þessi árgangur enn mjög stór (þá 2+, Tafla 4).

Þá bar hinsvegar einnig mikið á 0+ og 1+ seiðum. Þessi mikli fjöldi seiða kemur líklega til með að valda því að flest seiðin á Fitjá munu þurfa 4 ár í ferskvatni. Því má búast við að gönguseiðaframleiðsla árinna dragist töluvert saman vorið 1988, en aukist aftur ári síðar. Líklega er þó seiðapéttleiki í ánni orðinn það mikill á nýjan leik að hann er farinn að rýra framleiðslugetu árinna.

Tafla 3. Fjöldi veiddra laxaseiða af mismunandi árgöngum í rafveiðum í Fitjá 28/7-2/8 1987. Staðirnir eru merktir inn á kort (Mynd 1).

Staður	Stærð m	fjöldi veiddra seiða á 100 m				
		0+	1+	2+	3+	4+
2	400	-	15.5	1.2	-	-
3-1	420	-	8.6	0.5	0.7	-
3-2	420	-	4.0	0.5	0.5	0.5
3-3	420	-	4.8	0.2	0.5	0.5
4	330	-	6.4	1.5	1.5	3.3
5	688	-	2.8	0.3	1.6	0.1
6	583	0.3	4.3	2.2	1.7	0.3
7	330	0.6	7.0	2.7	1.5	-
8	420	0.9	14.8	2.4	1.4	-
9	594	0.2	10.3	2.4	0.8	-

Tafla 4. Fjöldi veiddra laxaseiða af mismunandi aldri í rafveiðum í Fitjá 16-24/8 1987. Staðirnir eru merktir inn á kort (Mynd 1).

Staður	Stærð m	fjöldi veiddra seiða á 100 m			
		0+	1+	2+	3+/4+
1	16x11	-	5.1	14.8	-
3	25x7	2.3	14.9	31.4	-
4	30x12	2.8	2.5	11.9	0.6
5	30x18	12.6	2.6	2.8	0.6
6	25x12	10.7	2.7	3.0	0.7
7	30x10	21.3	2.7	2.3	2.7
8	26x10	24.2	5.4	11.1	-
9	25x18	12.7	4.7	3.8	-

Ástand seiðastofna á Ólaxgöngum svæðum

Eins og fyrr getur eru smáseiðasleppingar stærsti þátturinn í ræktun Víðidalsár. Þetta er eðlilegt því að í árkerfinu eru stór svæði ofan Ófiskgengra fossa, sem eru einkar vel fallin til uppeldis laxaseiða. Ólíkt því sem gerist á laxgöngum svæðunum getum við stjórnað þéttleika seiða á hverjum tíma nokkuð nákvæmlega, og þar með haft veruleg áhrif á afkomumöguleika þeirra.

Í Töflu 5 eru teknar saman sleppingar í Víðidalsá og Fitjá á árunum 1984 - 1987.

Tafla 5. Yfirlit yfir smáseiðasleppingar á Ólaxgeng svæði á vatnasvæði Víðidalsár 1984-1987.

1984	fjöldi	sleppistaður	sleppitími
Víðidalsá	17500	Fyrir framan Hrappstaði	júlí
Kambá	15000	Dreift um alla ána	júlí
Fitjá	1500	Fyrir framan Bjarnafoss	júlí
1985			
Víðidalsá	10000	Bergá - Öxná, vesturbakki (5 km)	12 júní
Víðidalsá	10000	Bergá - Öxná, austurbakki (5 km)	9 ágúst
Kambá	5000	Valdaássel - Kambshóll (2.5 km)	12 júní
Kambá	5000	Framan Valdaássels (2.5 km)	9 ágúst
1986			
Víðidalsá	7500	Bergá - Heiðargirðing (4 km)	26 maí
Víðidalsá	10000	Bergá - Öxná (5 km)	29 júlí
Kambá	3000	Á ca 2.5-3 km f framan Valdássel	26 maí
Kambá	2000	Á ca 2.0 km f neðan Kambshól	26 maí
Kambá	4000	Valdaássel - Kambshóll	28 júlí
1987			
Víðidalsá	21000	Bergá - Öxnafoos	29 maí
Víðidalsá	4000	Hrappstaðir - Bergá	29 maí
Kambá	10000	Stóra Hvarf - niður fyrir brú	28 maí

Í sleppingum 1986 voru seiðin 0.7 g og 4 cm um vorið, og 1.8 g og 6.5 cm um haustið (að meðaltali).

Þegar seiðin koma í ána þurfa þau nokkurn tíma til að aðlagast breyttum aðstæðum, nýta sér náttúrulega fæðu og venjast nýju umhverfi. Hversu vel þeim reiðir af er því líklega að einhverju leiti háð sleppitíma. Því var reynt að kanna áhrif sleppitíma á afkomu seiðanna. Sleppt var smáum seiðum snemma vors á ákveðin svæði í Víðidalsá og Kambá og stærri seiðum síðla sumars á aðra, en sambærilega staði. Árið 1986 var tilraunin endurtekin, en þá var stöðunum víxlað (Tafla 5).

Lengdar- og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Kambá 1986 og 1987 er sýndur á Mynd 6, og reiknuð veiði á hverja 100 m í Töflu 6.

Tafla 6. Fjöldi veiddra laxaseiða á mismunandi aldri í Kambá 1/8 1986 og 20/8 1987. Staðirnir eru merktir inn á kort (Mynd 1).

1986

Stöð	Stærð	fjöldi veiddra seiða á 100 m		
	m	0+	1+	2+
1	300	8.3	7.7	-
2	300	12.0	17.7	0.3
3	300	7.3	3.3	-
4	300	7.7	2.0	0.7

1987

Stöð	Stærð	fjöldi veiddra seiða á 100 m		
	m	0+	1+	2+
1	50x5	7.2	4.4	1.2
2	50x5	22.0	8.8	1.6
3	65x5	8.3	7.5	-
4	60x4	8.7	4.2	0.4

Niðurstöður rafveiða á ólaxgengum svæðum í Víðidalsá (veiðistöðum 1-4) eru í Töflum 1-2 og á Myndum 2 og 3. Þegar borinn er saman árangur vor- og miðsumarsleppinga á smáseiðum, kemur í ljós að afkoman úr vorsleppingum 1985 virðist heldur betri en úr haustsleppingum. Afkoma mismunandi sleppihópa 1986 er hinsvegar mjög svipuð, jafnvel heldur betri úr haustsleppingunni.

Sleppistöðunum var víxlað milli ára, þannig að á svæðið þar sem seiðum var sleppt á haustið 1985 var aftur sleppt seiðum vorið 1986, en á svæðið þar sem sleppt var á vorið 1985 var ekki sleppt á aftur fyrr en haustið 1986. Annars vegar liðu nokkrar vikur af vaxtartíma á milli sleppinga, en í hinu tilfellinu nokkrir mánuðir, nærri tvö heil tímabil.

Niðurstöðurnar benda til að áhrif árgangs hver á annan sé afgerandi þáttur í afkomu þeirra. Aðrar athuganir benda til að jafnvel geti verið rétt að sleppa seiðum annað hvort ár á sömu staði til að tryggja sem bestan árangur.

Þess ber einnig að gæta að sleppingar 1986, bæði vor og haust, voru fyrr en sleppingarnar 1985, og þetta gæti einnig haft áhrif á niðurstöðurnar. Það virðist sem sagt lítið unnið með því að sleppa mjög snemma, en sleppingar eftir að komið er fram í ágúst skila að líkindum lakari árangri en sleppingar fyrr um sumarið.

Almennt virðast þó allar sleppingar alveg frá 1984, hafa tekist vel. Haustið 1986, og þó sérstaklega haustið 1987 er farið að bera á því að vaxandi hlutfall sleppiseiða dvelur þrjú ár í ánni í stað tveggja áður, sem bendir til að við endurteknar sleppingar á sömu svæðin verður að minnka þéttleika sleppinga enn frekar frá því sem nú er (viðmiðunin nú er 1 seiði á hverja 5 fermetra af uppeldissvæði á ári). Einnig kemur til greina að sleppa annaðhvert ár á þessi svæði (sleppa á hverju ári, en víxla svæðum milli ára).

ALDURSGREINING HREISTURSÝNA

Vöxtur laxa endurspeglast í mynstri hringja í hreistri þeirra. Þegar vöxtur laxaseiða er misjafn eftir svæðum í ánni, má með greiningu hreisturs af fullorðnum löxum rekja uppruna þeirra til hinna ýmsu svæða. Eins og greint er frá hér að framan er verulegur munur á ferskvatnsaldri seiða af náttúrulegum uppruna og seiða úr sleppingum. Að vísu verður einhver skörun og ýmsir aðrir þættir geta einnig valdið óvissu í greiningu.

Í flestum tilfellum er þó líklegra að lax af sleppiuppruna greinist sem náttúrulegur, frekar en öfugt. Með greiningu hreisturs fæst því hugmynd um lágmarks-heimtur eða árangur smáseiðsleppinga. Reynt hefur verið að nota merkingar til að fá aðra áætlun um árangur smáseiða-sleppinga, en ekki hefur reynst hægt að fylgjast nógu vel með afla veiðimanna til að nokkuð sé hægt á þeim að byggja.

Árið 1986 bárust alls 117 hreistursýni, þar af 95 af löxum veiddum í Viðidalsá, þar af sjö veiddum í gildru efst í ánni og 22 sýni af löxum úr Fitjá. Niðurstöður aldursgreiningar eru teknar saman í Töflu 7.

Tafla 7. Samantekt á niðurstöðum aldursgreiningar hreisturs af löxum sem veiddust í Viðidalsá og Fitjá 1986.

VÍÐIDALSÁ

Ferskvatnsaldur ár	Sjávaraldur					
	1 ár fjöldi	%	2 ár fjöldi	%	3 ár fjöldi	%
2	16	31	-	-	2	18
3	9	18	12	57	5	46
4	16	31	8	38	3	27
5	8	16	1	5	1	9
6	2	4	-	-	-	-
Samtals	51	100	21	100	11	100

9 hreistursýni ólæsileg

3 hreistursýni af löxum sem höfðu hrygnt áður

Tafla 7. framhald

FITJÁ

Ferskvatnsaldur ár	1 ár		Sjávaraldur 2 ár	
	fjöldi	%	fjöldi	%
3	2	18	2	50
4	6	55	1	25
5	3	27	1	25
Samtals	11	100	4	100

5 hreistursýni ólæsileg
2 af löxum sem höfðu hrygnt áður.

Niðurstöður fyrir hvert sýni fylgja með á sér blöðum. Í Fitjá eru sýnin svo fá að á þeim er lítið að byggja. Í Víðidalsá reyndust 31% smálaxa hafa dvalið tvö ár í ferskvatni, og því verið af sleppiuppruna. Þar af náðust 8 laxar í gildruna. Séu gildrulaxarnir ekki teknir með, má ætla að 23% af veiddum smálaxi megi rekja til smáseiða-sleppinga (slepping 1983).

Árið 1987 bárust alls 349 sýni, 252 úr Víðidalsá 52 úr Fitjá og 45 úr gildrunni. Niðurstöður aldursgreininga hreisturs eru í Töflu 8.

Tafla 8. Samantekt á niðurstöðum aldursgreiningar hreisturs af sen veiddust í Víðidalsá og Fitjá 1987.

VÍÐIDALSÁ

Ferskvatnsaldur ár	1 ár		Sjávaraldur 2 ár		3 ár	
	fjöldi	%	fjöldi	%	fjöldi	%
2	13	20	29	19	6	30
3	23	35	48	32	7	35
4	25	39	68	44	6	30
5	4	6	8	5	1	5
Samtals	65	100	153	100	20	100

12 sýni voru ógreinanleg
2 sýni voru af löxum sem höfðu hrygnt áður
4 smálaxar með þriggja ára ferskvatnsdöl eru líklegast af sleppiuppruna.

Tafla 8. Framhald

FITJÁ

Ferskvatnsaldur ár	1 ár		Sjávaraldur	
	fjöldi	%	2 ár fjöldi	%
2	9	30	3	15
3	3	10	-	-
4	12	40	16	85
5	6	20	-	-
Samtals	30	100	19	100

3 sýni voru ógreinanleg.

KOLA (Gildra)

Ferskvatnsaldur ár	1 ár		Sjávaraldur	
	fjöldi	%	2 ár fjöldi	%
2	11	58	18	75
3	8	42	4	17
4			2	8
Samtals	19	100	24	100

1 sýni var ógreinanlegt

1 sýni var af laxi sem hafði hryngt áður
flestir laxanna sem höfðu dvalið þrjú ár í sjó
voru greinilega af sleppiuppruna (sjá fylgiblöð)

Þar kemur í ljós að um fjórða hvern smálax sem veiddist á stöng í Víðidalsá má rekja til sleppinga, og var fimmti hver úr sleppingu 1984. Í Fitjá var þetta hlutfall hærri en sýnin færri og óvissa af þeim sökum því meiri. Nær allan lax sem kom í gildruna og tekin voru sýni af mátti rekja til smáseiðasleppinga. Af stórlaxinum mátti rekja um fimmta hvern lax til smáseiðasleppinga.

ÁLYKTANIR.

Veiðin 1986 og 1987 var mjög góð. Skipting hennar eftir sjávaraldri var sem hér segir.

	Heildarveiði	Smálax 1 ár í sjó	Stórlax 2 ár í sjó	Boltar 3 ár í sjó
1986	1541	943	543	55
1987	1563	643	876	44

Hlutfall milli eins og tveggja ára laxa helst gott og það, ásamt niðurstöðum rafveiðanna, boða gott fyrir sumarið. Um 20% aflans eða rúmlega 300 laxa má rekja beint til smáseiða-sleppinga, en þetta þýðir að tæpt 1% þeirra komi fram í stangveiði. Þar við bætast svo þeir laxar sem veiðast í gildruna.

Niðurstöður rafveiða benda til að heimtur úr smáseiða-sleppingum muni batna á næstu árum, og til að fá áreiðanlegri niðurstöður er nauðsynlegt að bæta sýnatökuna enn frekar og jafnvel að reyna merkingar aftur. Sjálfsagt er að halda áfram smáseiðasleppingum, og með sleppingum í Fitjá fyrir framan Bjarnafoss mætti auka þær heldur frá því sem nú er.

Ástand seiðastofna í Fitjá og Víðidalsá fylgist ekki alltaf að og það væri gott að halda alveg sér veiðiskýrslur úr þessum tveimur ám, til að hægt sé að meta betur ástandið í hvorri um sig.


Með auknum sleppingum er þörf á að auka nýtingu laxins sem snýr aftur, til að of mikil seiðamergð rýri ekki um of uppeldisskilyrði á laxgengum svæðum. Vegagerð upp með Fitjá, gildruveiði í Kolugljúfrum og veiðistaðagerð eru allt góðar leiðir að þessu marki.

HEIMILDIR


Tumi Tómasson og Finnur Garðarsson 1985. Víðidalsá 1984
Skýrsla Veiðimálastofnunar, VMST/R85021 12 bls.

Tumi Tómasson 1986. Víðidalsá 1985.
Skýrsla Veiðimálastofnunar, VMST-N/86007X 16 bls.


Tumi Tómasson 1987. Víðidalsá 1986.
Skýrsla Veiðimálastofnunar, VMST-N/87011X 3 bls.




Mynd 1. Yfirlit yfir rafveiðistaði í Viðidalsá og Fitjá 1986 og 1987.



Mynd 2. Lengdar og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Víðidalsá 27/7-2/8 1986 eftir stöðum (Mynd 1).




Mynd 3. Lengdar og aldursdreifing veiddra
laxaseiða í Viðidalsá 16-24/8 1987
eftir stöðum (Mynd 1).



Mynd 4. Lengdar og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Fitja 28/7 - 2/8 1986 eftir stöðum (Mynd 1).


Yoldi




Lengd í cm

Mynd 5. Lengdar og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Fitjá 16-24/8 1987 (Mynd 1).

Fjöldi 1986



Fjöldi 1987



Mynd 6. Lengdar og aldursdreifing veiddra laxaseiða í Kambsá 28/7-2/8 1986 og 16-24/8 1986 (Mynd 1).

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: *Viðdalsá*Fisktegund: *lax*

Sendandi:

Fjöldi sýna:

Veidiár: *1986*

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
1	7.-7.	♂	65	3.2	3+	1+	N-Laufásbreiða
2	—	♂	107	11.5	5+	3+	GRABAR
3	—	♀	67	2.7	4+	1+	
4	—	♀	67	2.7	3	1+	Dalsárós
5	8.-7.	♀	83	5.7	5	2+	Ármót
6	—	♀	62	2.5	3+	2+	Gardar
7	—	♀	65	3.0	2+	1+	Brúin
8	—	♂	93	9.5	3+	2+hr1+	Gardar
9	9.-7	♂	64	3.0	4+	1+	Brúin
10	—	♂	88	2.5	4+	1+	Gardar
11	—	♀	80	6.2	4	2+	N-Laufásbreiða
12	—	♂	53	2.2	3+	1+	— " —
13	—	♂	67	4.0	2	1+	Gardar
14	10.-7	♀	61	2.0	4	1+	Steinafljót
15	—	♀	76	5.0	4	2+	— " —
16	—	♂	69	3.0	3+	1+	Steinafljót
17	—	♂	62	2.0	5	1+	— " —
18	—	♂	66	2.6	2	1+	Ármót
19	11.-7	♂	62	3.0	3+	1+	Gardsendi
20	—	♂	65	2.5	4	1+	N-Kotbakki
21	—	♂	94	8.0	3+	2+	— " —
22	—	♂	64	2.7	4+	1+	Gardsendi
23	—	♂	70	4.0	2+	1+	N-Kotbakki
24	—	♀	80	6.2	3+	2+hr++	Gardsendi
25	—	♀	63	2.6	ólosil		Ármót
26	12.-7	♀	78	5.6	3+	2+	Steinafljót
27	—	♂	101	8.2	3+	2+	Ármót
28	—	♀	82	5.2	3+	2+	— " —
29	15.-7	♀	80	5.7	4	2+	Dalsárós
30	—	♂	104	12.0	3+	3	— " —
31	—	♂	65	2.5	2+	1+	N-Laufásbr
32	—	♂	102	11.0	3	3	— " —
33	—	♂	108	14.0	4	3+	— " —
34	16.-7	♂	66	3.0	5	1+	Dalsárós

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall:

Dalsá

Fisktegund:

Lax

Sendandi:

Fjöldi sýna:

Veidiár:

1986

Númer	Veididagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
35	17.-7	♀	75	4.5	3	2+ ss	Dalsárós
36	18.-7	♀	81	5.0	3+	2+	Steinaffhótt
37	21.-7	♂	80	5.2	4+	2+	Hörnöt
38	—	♂	67	3.0	öngt		Hörnöt
39	—	♂	66	2.7	4	1+	Steinaffhótt
40	25.-7	♀	77	5.7	4	2+	Hörnöt
41	—	♂	58	2.2	5	1+	—
42	—	♂	65	3.0	5+	1+	—
43	—	♂	65	3.5	4+	1+	—
44	—	♀	64	3.0	4+	1+	—
45	—	♀	90	7.0	4	2+	—
46	26.-7	♂	88	7.0	2+	3	—
47	26.-7	♂	68	3.0	4+	1+	—
48	—	♂	54	2.0	4+	1+	—
49	27.-7	♂	68	2.7	6	1+	—
50	—	♀	94	7.9	3+	2+	—
51	28.-7	♂	91	7.0	4	3	Gardar
52	—	♂	98	8.5	öngt		Dalsárós
53	29.-7	♂	65	3.0	2+	1+	Harðeyrarströngu
54	—	♀	64	3.0	3	1+	—
55	—	♀	69	3.2	3	1+	Stekkjarsvípi
56	31.-7	♂	100	9.4	3+	3	
57	—	♂	73	3.9	3+	1+	Harðeyrarstr.
58	—	♂	92	7.2	öngt		—
59	—		smálar	2.5	2	1+	Kobugljúfur
60	—		—	2.5	2+	1+	—
61	—		—	2.5	2	1+	—
62	—		—	2.5	2+	1+	—
63	1.-8.	♂	100	10.9	2	3	
64	—	♂	63	2.7	2+	1+	E-Valkylur
65	—	♂	100	10.4	3	3	
66	—	♀	61	2.1	5	1+	Hegeirsinbakki
67	—	♂	68	3.1	öngt.		—
68	—	♀	80	5.2	4	2+ hr +	Dalsárós

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

Vatnsfall: Stúdalaá

Fiskegund: *day*

Sondandi:

Fjöldi sýna:.....

Veidiár: 286

Númer	Veðidagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
69	3.-8	♀	88	7.0	blenilegt		Dalsárós
70	-4-	♂	67	3.2	2+	1+	Harðeyrarst.
71	-4-	♂	72	4.0	2	1+	Dalsárós
72	4.-8	♀	91	7.7	4+	3	Armöt
73	-4-	♀	95	7.8	3+	2+	— " —
74	-11-	♀	91	8.2	3+	2+	N-Laufarbrú
75	-4-	♀	64	3.0	4+	1+	Dalsárós
76	-11-	♂	70	4.0	4+	1+	Gærðsendi
77	-4-	♀	90	8.0	blenil.		E.-laufarbr.
78	5.-8	♂	66	3.0	4+	1+	Þorvaldabakk
79	6.-8	♀	86	7.0	4	2+	Armöt
80	10.-8	♂	110	14.0	3+	3	Dalsárós
81	21.-8	♂	62	2.7	3+	1+	Nikki
82	-11-	♂	72	3.6	6	1+	— " —
83	23.-8	♂	67	3.0	4+	1+	Kelir
84	-11-	♂	64	2.5	5+	1+	— " —
85	24.-8	♂	62	3.0	2+	1+	Gleraugnahylur
86	8.-8	♂		2.5	2	1+	Nýdalundur v/ Gildru
87	3.-9	♂		3.0	4	1+	Norn i gildru
88	19-9	♂		2.5	blenil.		— " —
89	-11-	♂		2.0	2+	1+	Steinafljót
90	-4-	♂		8.0	3+	2+	— " —
91	-11-	♂		8.0	3+	2+	E.-Valleytur
92	-4-	♂		8.0	4+	2+	I Gildru
93	-11-	♂		2.0	2	1+	E.-Valleytur
94	-11-	♂		2.5	blenil		Gleraugnahylur
95	-	♂		2.5	5+	1+	Gildru

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Wagaa

Fiskegrund: rax

Sendandi:

Příloha: sýna:.....

Veidið: 486

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
1.	14.7.	♂	56	1.7	4+	1+	Kerfoss
2.	-4-	♂	76	4.5	4+	2+4st	Kerit
3.	26.7.	♂	63	2.5	öngt		—
4.	28.7.	♂	60	2.3	4+	1+	Bugur
5.	-11-	♂	90	6.7	4+	2+4st	—
6.	-4-	♂	65	2.2	5	1+	Hermit
7.	29.7.	♂	64	2.4	4+	1+	Laxapollur
8.	30.7.	♂	58.5	1.7	4+	1+	Kerstapi
9.	-11-	♂	66.5	2.8	3	1+	—
10.	-11-	♂	61.	2.1	5+	1+	Bugur
11.	-11-	♂	63	2.4	5	1+	—
12.	2.-8	♂	62	2.5	öngt		Kerit
13.	22.-8	♀	90	7.2	3	2+55	
14.	-11-	♀	79	4.5	öngt		Herfljótt
15.	-11-	♀	87	6.7			
16.	-11-	♂	83	5.9	4+	2+	
17.	23.-8	♀	72	4.5	5+	2+	
18.	-11-	♂	67	2.7	4+	1+	
19.	9.-7	♀	63	2.5	4+	1+	Ker
20.	9.-7.	♂	63	2.5	3+	1+	—
21.	9.-9	♀		5.8	3+	2+	Herfljótt
22.	-11-	♂		2.2	öngt		Herfljótt

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Víðidalur

Fisktegund: Lax

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252

Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
67	08.07	♂	103	12.000	5+	2 ⁺ 1 ⁺	Simastengur
68	08.07	♀	89	8.000	4+	2+	Simastengur
69	08.07	♂	101	10.500	3+	3	Skinnalbjól
70	08.07	♀	90	6.500	2+	2+	Skinnalbjól
71	08.07	♀	80	5.000	4+		Skinnalbjól
72	09.07	♀	95	8.000	4+	2+	Arnól
73	09.07	♂	77	4.000	4+	2+	Arnól
74	09.07	♂	59	2.500	4+	1+	Brúin
75	09.07	♂	66	3.500	2+	1+	Brúin
76	09.07	♂	60	2.500	3	1 ^{ss}	Brúin
77	09.07	♀	53	2.500	4	1+	Brúin
78	09.07	♂	70	4.000	4	1+	Dalsáreis
79	09.07	♀	80	5.000	5	2+	Dalsáreis
80	09.07	♀	90	9.000	5+	2+	Dalsáreis
81	09.07	♂	95	9.500	2+	2+	Fossar
82	09.07	♀	87	6.500	4+	2+	Skinnalbjól
83	09.07	♀	88	9.000	2+	2+	Þrúkaðslakki
84	09.07	♀	93	10.000	2	2+	Þrúkaðslakki
85	10.07	♂	61	2.350	3+	1+	Arnól
86	10.07	♀	83	6.000	4+	2+	Arnól
87	10.07	♀	88	6.500	4+	2+	Þausarab.
88	10.07	♀	89	7.500	4	2+	Dalsáreis
89	10.07	♀	86	7.300	4	2	Dalsáreis
90	10.07	♀	82	6.500	2+	2+	Fossar
91	10.07	♀	91	7.400	2+	2+	Simastengur
92	10.07	♂	92	7.400	3+	2+	Skinnalbjól
93	11.07	♀	88	6.000	3+	2+	Gaðsandi
94	11.07	♀	58	1.300	4	1+	Þundahylur
95	11.07	♀	90	6.400	3+	2+	Þundahylur
96	11.07	♂	97	10.000	2+	2+	N.-Laufásbrúða
97	11.07	♀	84	7.500	3+	2+	Þetri-Vallhylur
98	12.07	♀	85	5.600	3+	2+	Arnól
99	12.07	♀	92	8.500	4+	2+	Dalsáreis

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Viðidalsá

Fisktegund: Lat

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252

Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
100	12.07	♀	85	6.500	2+	2+	Simastrengur
101	13.07	♀	88	8.500	4	2+	Þrömol
102	13.07	♀	86	7.000	2+	2+	Þrömol
103	13.07	♂	30	8.000	í ferskvatni		Þrömol
104	13.07	♂	58	1.500	4+	1+	Dalsárós
105	13.07	♀	85	6.600	4+	2+	Dalsárós
106	13.07	♀	91	8.550	3	2+	Dalsárós
107	13.07	♀	88	7.000	4+	2+	Dalsárós
108	13.07	♂	86	6.300	2+	2+	Dalsárós
109	13.07	♀	94	8.200	í ferskvatni		Dalsárós
110	13.07	♀	84	6.500	4+	2+	Dalsárós
111	13.07	♂	60	2.200	2	1+	Garðsendi
112	13.07	♂	56	1.850	4+	1+	Flundakylur
113	13.07	♀	54	1.800	5	1+	Flundakylur
114	13.07	♂	65	2.400	2+	1+	Flundakylur
115	13.07	♀	59	2.500	3+	1+	Simastrengur
116	13.07	♀	83	6.000	4+	2+	Simastrengur
117	13.07	♀	84	6.500	4+	2+	Simastrengur
118	14.07	♂	97	9.500	4+	1+	Dalsárós
119	14.07	♂	62	2.500	4	1+	Dalsárós
120	14.07	♀	84	6.500	4+	2+	Flundakylur
121	14.07	♀	96	9.500	4+	2+	Flundakylur
122	14.07	♂	72	4.000	2	1+	Flundakylur
123	14.07	♀	91	7.500	4+	2+	Simastrengur
124	14.07	♀	83	5.500	4+	2+	Simastrengur
125	14.07	♀	82	5.250	3+	2+	Keinablíð
126	15.07	♀	76	5.000	5+	2+	Þrömol
127	15.07	♀	85	6.250	3+	2+	Dalsárós
128	15.07	♀	84	6.000	4+	2+	Dalsárós
129	15.07	♀	90	7.000	3+	2+	Flundakylur
130	15.07	♀	84	5.500	2+	2+	Kalir
131	15.07	♀	88	7.500	3+ þrömol	2+	Kalir
132	15.07	♀	89	8.500	í ferskvatni		Simastrengur

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: ViðidalsáFisktegund: lav

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
133	15.07	♂	64	3.000	4+	1+	Simasbrungur
134	15.07	♂	96	3.500	4	3+	Simasbrungur
135	15.07	♀	87	8.000	4	2+	Ökinallól
136	15.07	♂	64	3.000	4+	1+	N-Valkudur
137	15.07	♀	92	3.000	4+	2+	N-Valkudur
138	15.07	♀	92	8.500	2+	2+	Öbi-Valkudur
139	15.07	♀	85	7.000	4+	2+	Ö-Valkudur
140	15.07	♀	81	5.500	4+	2+	Ö-Valkudur
141	15.07	♀	85	6.500	4+	2+	Ö-Valkudur
142	15.07	♀	85	6.500	3+	2+	Öbi-Valkudur
143	17.07	♂	97.5	11.000	4+	2+	Dalsáris
144	18.07	♀	53	5.250	3+	2+	Amót
145	18.07	♀	90	6.500	2+	2+	Amót
146	18.07	♀	91	8.000	4+	2+	Dalsáris
147	18.07	♀	88	6.750	2+	2+	Dalsáris
148	18.07	♂	96	8.250	4+	2+	Dalsáris
149	18.07	♂	57	1.750	4+	1+	Harðugrassl.
150	18.07	♂	53	1.100	4+	1+	Skungabakkur
151	19.07	♀	86	7.500	insh. h.		Amót
152	19.07	♀	86	7.500	3+	2+	Dalsáris
153	19.07	♀	86	7.500	4+	2+	Dalsáris
154	19.07	♀	74	5.000	4+	2+	Dalsáris
155	19.07	♀	86	7.100	3+	2+	Harðugrassl.
156	19.07	♂	95	8.200	4+	2+	Kakur
157	19.07	♀	76	4.500	3+	2+	N-Valkudur
158	20.07		65	2.500	4+	1+	Dalsáris
159	20.07	♂	102	11.500	3+	3+	Dalsáris
160	20.07	♀	93	8.250	3+	2+	Skungabakkur
161	20.07	♂	89	7.000	4	2+	Simasbrungur
162	20.07	♂	62	2.500	4+	1+	Simasbrungur
163	20.07	♀	82	7.000	4+	2+	Simasbrungur
164	20.07	♀	86	7.000	4+	2+	Simasbrungur
165	21.07	♀	84	7.500	4+	2+	Dalsáris

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: ViddalsáFisktegund: Lax

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
166	21.07	♂	66.5	3.500	3+	1+	Dalsáris
167	21.07	♀	95	9.000	3+	2+	Dalsáris
168	21.07	♀	86	7.500	3+	2+	Dalsáris
169	21.07	♀	83	8.000	3+	2+	Dalsáris
170	21.07	♀	88	8.500	3+	2+	Dalsáris
171	21.07	♀	90	8.500	3+	2+	Dalsáris
172	21.07	♀	81	6.000	4+	2+	Núni Laxapollur
173	21.07	♂	62	2.400	4+	1+	Simastengur
174	22.07	♀	63	2.500	4+	1+	Ármót
175	22.07	♂	59	2.000	3+	1+	Ármót
176	22.07	♀	89	7.500	4+	2+	Ármót
177	22.07	♂	62	2.500	3	1+	Bakkahlól
178	22.07	♂	56	1.500	4+	1+	Gallarnesfljót
179	22.07	♂	94	8.100	3+	2+	Simastengur
180	23.07	♂	65	2.800	2+	1+	N.-Vallur
181	23.07	♀	70	3.200	3	1+	N.-Vallur
182	24.07	♀	90	8.250	2+	2+	Dalsáris
183	24.07	♀	90	8.500	3+	2+	Dalsáris
184	24.07	♂	105	13.000	4+	2+	Dalsáris
185	24.07	♀	81	6.500	3+	2+	Flungabakki
186	25.07	♂	96	10.000	3+	3	Dalsáris
187	25.07	♀	82	6.000	4+	2+	Dalsáris
188	25.07	♀	93	9.500	2+	2+	Kalir
189	26.07	♀	90	7.500	3+	2+	Dalsáris
190	26.07	♀	89	7.500	3+	2+	Harðarsarls.
191	26.07	♂	111	16.000	4+	3+	Kalir
192	27.07	♂	63	2.500	3+	1+	Ármót
193	27.07	♀	92	7.500	3+	2+	Ármót
194	27.07	♂	67	2.250	2+	1+	Dalsáris
195	27.07	♀	88	7.000	4+	2+	Simastengur
196	27.07	♂	67	3.500	5+	1+	Simastengur
197	27.07	♀	87	7.000	2+	2+	Öfri - Vallur
198	28.07	♀	72	4.500	3+	2+	Bakkahlól

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Viðidalsá

Fisktegund: lax

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252

Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
199	28.07	♀	86	6.000	4	2+	Dalsáros
200	28.07	♂	64	2.500	2+	1+	Dalsáros
201	28.07	♀	98	11.000	3+	3	Dalsáros
202	28.07	♂	67	2.750	2+	1+	Gröðmundi
203	28.07	♂	67	3.000	4+	1+	Hartunarsl.
204	29.07	♀	91	9.000	4+	2+ 1-	Dalsáros
205	29.07	♀	87	6.500	2+	2+	Gröðmundi
206	29.07	♂	71	4.000	2+	1+	Klungabakki
207	29.07	♂	62	2.250	4+	1+	Skinnakylur
208	29.07	♂	61	2.500	4+	1+	Skinnakylur
209	29.07	♂	59	2.300	4	1+	Skinnakylur
210	29.07	♂	56	2.000	3+	1+	Skinnakylur
211	30.07	♂	54	2.500	3+	1+	Gallarnesfjöl
212	30.07	♀	91	9.000	4+	2+	Gallarnesfjöl
213	30.07	♂	78	2.500	3+	1+	Ómasbrungur
214	30.07	♀	80	3.000	3 ⁺⁺	1+	Ólökkjallbál
215	31.07	♂	69	2.500	3+	1+	Þeginsárbréða
216	31.07	♂	68	2.500	innif. l.		Þeginsárbréða
217	31.07	♂	69	2.500	3+	1+	Þeginsárbréða
218	31.07	♀	68	3.500	4	1+	Dalsáros
219	01.08	♂	64	2.250	4+	1+	Faxi
220	01.08	♂	62	2.250	innif. l.		Kahr
221	01.08	♀	89	8.500	2+	2+	Ómasbrungur
222	01.08	♂	56	2.200	4+	1+	Ö-Valhrytur
223	02.08	♂	72	4.000	3 ⁺⁺	1+	Þeginsárbakki
224	02.08	♂	69	3.000	3+	1+	Þeginsárbréða
225	05.08	♂	67	2.600	3 ⁺⁺	1+	Klungabakki
226	09.08	♂	59	1.800	2+	1+	Dalsáros
227	19.08	♀	72	4.500	5+	2+	
228	19.08	♀	91	8.500	4+	2+	
229	19.08	♂	67	3.000	3+	1+	
230	19.08	♂	100	11.000	3+	2+	
231	19.08	♀	67	2.500	3+	1+	

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

Vatnsfall, *Vididalsá*

Fiskegund: lax

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252

Veidiár: 1987

[illegible]

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: *Viðidalsá*

Fisktegund: *lax*

Sendandi:

Fjöldi sýna: *252*

Veidiár: *1987*

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
1		♀	86	7.500	4+	2+	
2		♂	58	2.500	5+	1+	
3		♀	85	8.500	4+	2+	
4		♂	95	10.000	5+	3	
5		♂	95	11.000	4+	3+	
6		♂	98	13.000	3+	3	
7		♀	90	10.250	4	3	
8			80	5.500	5+	2+	
9	15.06	♀	90	9.000	3+	2+	Dalsárvör
10	16.06	♀	90	7.400	3+	2+	Brúin
11	16.06	♀	92	8.550	3+	2+	
12	16.06	♀		7.000	2	2+	
13	16.06			8.000	2	2+	
14	16.06	♀		8.000	4+	2+	
15	16.06	♀	87	7.000	3+	2+	Ármöl
16	16.06	♀	88	8.000	öngfyllt lax		Ármöl
17	16.06	♂	99	10.000	4+	2+	Brúin
18	16.06		82	12.000	3+	2+	Áklar
19	16.06	♀	85	6.500	2	2+	Simastrengur
20	16.06	♀	83	6.500	4+	2+	Simastrengur
21	17.06	♀		7.500	2+	2+	
22	17.06	♀	75	5.000	3+	2+	Simastrengur
23	17.06	♀	85	6.500	3+	2+	Simastrengur
24	28.06	♂	103.5	10.500	2+	3	Simastrengur
25	28.06	♂	60	1.850	4+	1+	Simastrengur
26	29.06	♂	87	7.000	4+	2+	Ármi
27	01.07	♂	98	10.000	4	2+	Dalsárvör
28	02.07	♀	89	7.600	2+	2+	Þeggsá b.
29	03.07	♀	85	6.900	öngfyllt lax		
30	03.07	♀	85	8.400	3+	2+	Dalsárvör
31	04.07	♀	87	7.250	2+	2+	Dalsárvör
32	04.07	♀	90	7.250	2+	2+	Dalsárvör
33	14.07	♀	93	8.500	4+	2+	N-lauðastri

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Viðidalsá

Fisktegund: Lox

Sendandi:

Fjöldi sýna: 252

Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
34	05.07	♀	80	6.500	3+	2+	Gagnastokkur
35	06.07	♀	90	8.500	4+	2+	Armól
36	06.07	♀	85	6.700	3+	2+	Dalsárós
37	06.07	♂	94	8.400	3+	2+	Dalsárós
38	10.07	♀	86	7.500	4+	2+	Dalsárós
39	06.07	♀	89	6.900	3+	2+	Fossar
40	06.07	♀	81	5.300	4	2+	Fossar
41	06.07	♀	89	7.200	2+	2+	N-Kollakki
42	06.07	♂	53	2.000	2+	1+	Wikki
43	06.07	♂	59	2.000	3+	1+	Óimastlungur
44	07.07	♂	97	8.500	4+	2+	B. Kollakki
45	07.07	♂	89	7.200	2+	2+	Óimastlungur
46	07.07	♂	82	6.250	4+	2+	Ólínalbjört
47	08.07	♀	93	8.500	3+ ^{ss}	2+	Armól
48	08.07	♂	80	5.000	5+	2+	Armól
49	08.07	♀	87	8.000	4+	3+	Armól
50	08.07	♂	59	2.500	4+	1+	Armól
51	08.07	♂	82	6.000	4+	2+	Armól
52	08.07	♀	90	8.000	4+	2+	Dalsárós
53	08.07	♀	79	5.500	5	2	Dalsárós
54	08.07	♀	62	2.500	4+	1+	Gallanús
55	08.07	♀	89	9.000	3+	2+	Harðyparrlungur
56	08.07	♀	93	8.000	4+	2+	Harðyparrlungur
57	08.07	♂	62.5	3.000	3	1+	Harðyparrlungur
58	08.07	♀	90	9.000	3+	2+	Harðyparrlungur
59	08.07	♂	67	3.000	2+	1+	Harðyparrlungur
60	08.07	♀	81	5.500	2+	2+	Harðyparrlungur
61	08.07	♀	85	6.500	2+	2+	Harðyparrlungur
62	08.07	♀	91	8.000	4+	2+	Ólungabakki
63	08.07	♀	86	7.500	4	2+	Ólungabakki
64	08.07	♀	84	7.500	2+	2+	Óimastlungur
65	08.07	♀	87	7.000	5+	2+	Óimastlungur
66	08.07	♀	81	6.000	2+	2+	Óimastlungur

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: *Filjá*

Fisktegund: *Lax*

Sendandi:

Fjöldi sýna: *52*

Veidiár: *1987*

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
1	15.06	♀	58	2,000	3 ⁺	1 ⁺	Laxapollur
2	07.07	♀	84	6,000	4 ⁺	2 ⁺	Bugur
3	07.07	♀	78	5,000	2 ⁺	2 ⁺	Árísabréða
4	07.07	♀	77	4,750	4 ⁺	2 ⁺	Árísabréða
5	07.07	♂	60	2,000	4 ⁺	1 ⁺	Kerlapi
6	07.07	♀	82	5,000	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur
7	07.07	♀	78	5,000	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur
8	07.07	♀	76	4,500	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur
9	07.07	♂	87	6,500	óhorfð hr		Laxapollur
10	07.07	♀	70	4,000	4 ⁺	2 ⁺	Úlmakvörn
11	08.07	♀	56	2,500	2 ⁺	1 ⁺	Kerf
12	08.07	♂	56	2,500	2	1 ⁺	Kerfoss
13	08.07	♂	81	6,000	innifl. hr		Kerfoss
14	08.07	♂	56	2,500	3 ⁺	1 ⁺	Kerlapi
15	08.07	♀	79	5,000	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur
16	09.07	♀	88	7,500	2 ⁺	2 ⁺	Gastur
17	09.07	♂	59	2,000	5 ⁺	1 ⁺	Ker
18	09.07	♂	58	1,900	5 ⁺	1 ⁺	Ker
19	11.07	♂	80	5,500	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur
20	13.07	♂	64	2,500	4	1 ⁺	Ker
21	15.07	♂	59	2,500	2	1	Gjörðingashylur
22	15.07	♂	59	2,000	4 ⁺	1 ⁺	Ker
23	15.07	♂	66	2,750	2	1 ⁺	Ker
24	15.07	♂	58	2,000	4 ⁺	1 ⁺	Ker
25	15.07	♀	54	2,000	4 ⁺	1 ⁺	Ker
26	15.07	♂	60	2,000	3 ⁺	1 ⁺	Kerfoss
27	15.07	♀	53	1,900	5	1 ⁺	Kerfoss
28	15.07	♂	63	2,300	4 ⁺	1 ⁺	Kerfoss
29	16.07	♂	64	2,500	5	1 ⁺	Kerf
30	17.07	♂	57	1,250	2 ⁺	1 ⁺	N-Laxapollur
31	19.07	♂	60	2,500	4 ⁺	1 ⁺	N-Laxapollur
32	19.07	♂	92	6,750	4 ⁺	2 ⁺	N-Laxapollur
33	19.07	♂	73	3,500	4 ⁺	2 ⁺	Laxapollur

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall:

Fiskegund:

Sendandi

Fjöldi sýna:

Veidiár: _____

[illegible]

VEIÐIMÁLASTOFNUNIN
PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Vatnsfall: Kola

Fisktegund: Lax

Sendandi: _____

Fjöldi sýna: 45

Veidiár: 1987

Númer	Veiddagur	Kyn	Lengd í cm.	Þyngd í kg.	Ár í ferskvatni	Ár í sjó	Athugasemdir
1	17.06	♀		6.000	2+	2+	
2	17.06	♀		8.000	2+	2+	
3	17.06	♀		8.500	2+	2+	
4	17.06	♀		9.000	2+	2+	
5	17.06	♀		7.000	2	2+	
6	17.06			8.000	2+	2+	
7	17.06	♀		7.500	2+	2+	
8	18.06	♀	85	6.700	2+	2+	
9	19.06	♀		5.500	2+	2+	
10	19.06	♀		5.500	2+	2+	
11	19.06			6.500	2+	2+	
12	19.06	♀		6.500	2+	2+	
13	19.06	♀		5.500	2+	2+	
14	19.06	♀		5.500	2+	2+	
15	19.06	♀		8.000	4+	2+	
16	21.06	♀		6.400	2+	2+	
17	22.06	♀		5.500	2+	2+	
18	24.06	♀		4.500	3+	2+	
19	10.07	♂		1.800	3+	1+	
20	13.07	♀		5.000	3+	2+	
21	28.07	♂		2.400	2+	1+	
22	01.08	♂		2.100	2+	1+	
23		♀		1.600	3	1+	
24		♀		6.600	2+	2+	
25	03.07	♀			4+	1+ 1+	
26	03.07	♀			3+	2+	
27	03.07	♀			4+	2+	
28	26.08	♀		2.300	3	1+ SS	
29	29.08	♂		2.700	2+	1+	
30	29.08			3.300	2+	1+	
31	29.08	♂		2.100	3+	2+ SS	
32	30.08	♂		2.500	crushed		
33	01.09	♂		3.700	2+	1+	

PÓSTHÓLF 754-101 REYKJAVÍK

HREISTURSÝNI

Fiskegrund: Lax

Fjöldi sýna: 45

Veidiár: 1987

[illegible]