

RANNSÖKNIR Á SEIDAÁSTANDI
Í VATNAKERFI BLÖNDU 1993


FRIDJÓN MÁR VIDARSSON
SIGURÐUR GUDJÓNSSON

VEIÐIMÁLASTOFNUN VMSTR/94008X

UNNIÐ FYRIR LANDSVIRKJUN

X-TAKMÖRKUD ÚTBREIDSLA
MA EKKI VITNA TIL
ÁN LEYFIS HÖFUNDA

Blanda
Seidagunrökun
Svarla
Hlidara
Audolfestadaa
G. lax, bl, urr.



VEIÐIMÁLASTOFNUN

Fiskrækt og fiskeldi • Rannsóknir og ráðgjöf

VAGNHÖFÐA 7
112 REYKJAVÍK
S: 91-676400
FAX: 91-676420

Efnisyfirlit

bls.

Inngangur.....	1
Framkvæmd.....	1
Niðurstöður.....	2
Umræða.....	3
Heimildir.....	3
Töflur.....	4
Myndir.....	7

Inngangur

Í Vatnakerfi Blöndu fóru fram seiðarannsóknir á síðasta sumri, eins og undanfarin ár. Þessar rannsóknir sem og aðrar í vatnakerfinu hafa staðið yfir vegna tilkomu virkjunar í Blöndu. Rannsóknirnar eru unnar fyrir Landsvirkjun. Eingöngu verður fjallað um seiðaástandið hér en öðrum athugunum verður gerð skil í öðrum skýrslum. Niðurstöður fyrri seiðaathugana hafa birst (Friðjón Már Viðarsson og Sigurður Guðjónsson 1993).

Framkvæmd

Hefðbundnum aðferðum var beitt í þessum athugunum, sem lýst hefur verið í fyrri skýrslum og vísast því til þeirra.

Ekki hefur verið hrygning upp á heiðum undanfarin sumur nema hjá staðbundnum silungi og því var ekki rafveitt þar.

Rafveitt var í byrjun ágúst í Svartá, Hlíðará, Auðólfssstaðaá og Blöndu (mynd 1). Í Blöndu var farið aftur um miðjan september þar sem aðstæður til rafveiða voru ekki nógu góðar þar í ágúst.

Í Svartá voru teknar níu stöðvar (mynd 2a). Í Hlíðará tvær stöðvar og í Auðólfssstaðaá ein stöð. Í Blöndu voru teknar þrjár stöðvar í ágúst en fjórar í september (mynd 2b).

Síritandi hitamælur voru í Svartá við Stafn og í Svartá ofan við ármót Blöndu. Í Blöndu var síritahitamælir við Eldjárnsstaði og við teljara í laxastiga við Ennisflúðir en þar var einnig handvirkur mælir. Hiti var einnig mældur af Landsvirkjun í inntakslóni virkjunar.

Niðurstöður

Í Svartá voru laxa-, bleikju- og urriðaseiði (mynd 3, 4, 5 og 6). Á 100 m² voru að meðaltali 2,0 laxaseiði, sem er meiri þéttleiki en árið 1992, bleikjuseiði voru 0.6 á 100 m² en urriðaseiði 0.2 á 100 m² (tafla 1).

Laxaárgangarnir voru frá vorgömlum (0+) upp í fjögurra (4+) ára (mynd 3 og 4).

Laxaseiði fundust ekki ofar en við Leifsstaði. Bleikja er meira ofarlega í ánni, þar sem minna er af laxi.

Í Blöndu voru laxa-, bleikju- og urriðaseiði (mynd 7, 8 og 9). Laxaseiði voru 0,8 á 100 m². Bleikjuseiði voru 2,0 á 100 m². Urriðaseiði voru 0,2 á 100 m² (tafla 1).

Í Hlíðará voru laxa- og urriðaseiði (mynd 10). Laxaseiði voru 1,8 á 100 m² en urriðaseiði voru 0,2 á 100 m² (tafla 1).

Í Auðólfssstaðaá voru laxa og bleikjuseiði (mynd 11). Laxaseiði voru 2,0 á 100 m² en bleikjuseiði voru 0,4 á 100 m² (tafla 1).

Meðallengdir, meðalþyngdir og holdastuðull fyrir hvern aldurshóp laxaseiða í Svartá koma fram í töflu 2.

Niðurstöður hitamælinga sjást í töflu 3 og myndum 12-16. Hiti var lægri í Svartá við Stafn en í ánni við ármót Blöndu, sömuleiðis var hiti í Blöndu við Eldjárnsstaði lægri en í Blöndu við Ennisflúðir. Meðalhiti er að jafnaði nokkuð lægri fyrri part sumars en hærri um haustið árið 1993, miðað við árið 1992 (tafla 3) (Friðjón Már Viðarsson og Sigurður Guðjónsson 1993). Hitastig í inntakslóni var heldur lægra en neðar í Blöndu en svipað og í Blöndu við Eldjárnsstaði (tafla 3, mynd 16).

Umræða

Seiðabúskapur tók við sér 1991, eftir lögð árin þar á undan, en seiðum fór fækkandi aftur 1992 og var með því slakasta sem hafði sést.

Ástandið í Svartá var svipað nú 1993 en þó eru örlítið fleiri seiði til staðar en árið á undan auk þess sem seiðin eru þyngrri miðað við lengd. Lítill munur er á fjölda seiða af mismunandi aldri.

Í Hlíðará og Auðólfssstaðaá er minna um laxaseiði miðað við árið á undan.

Seiðafjöldi í Blöndu nú er sambærilegur og í rafveiðum 1991 en fjöldi laxaseiða árið 1991 dreifist á fleiri árganga en nú árið 1993. Meira var um urriða og bleikjuseiði í Blöndu 1993 en 1991. Seiðamælingar í Blöndu eru oft erfiðar vegna svifaurs og var svo einnig nú og hefur það áhrif á niðurstöður.

Ljóst er að seiðabúskapur er enn í lögð og óvíst er hversu lengi þetta ástand varir. Seiðabúskapur árkerfa sveiflast ávallt eitthvað og því er æskilegt að skoða ástandið árlega.

Sumarið 1993 var svalt og kemur það fram í lágum vatnshita og litlum seiðavexti. Greinilegt er að vatn í lónum og veituleið virkjunar er nokkurn tíma að hitna á vorin en heldur varma lengur fram á haust. Hvort þessi breyting á hitafari árinna kemur til með að hafa áhrif á hrygningu, klak og seiðabúskap í ánni, verða rannsóknir að leiða í ljós.

Heimildir

Friðjón Már Viðarsson og Sigurður Guðjónsson 1993. Rannsóknir á seiðaástandi í Vatnakerfi Blöndu 1992. Veiðimálastofnun. VMSTR/93005X.

Tafla 1 . Fjöldi seiða á hverja 100 m² í einni rafveiðiferð 1993.

Á	Stærð		Fisk teg.	Fjöldi seiða eftir aldri á 100 m ²						Alls
	Fjöldi stöðva	stöðva (m ²)		0	1	2	3	4	5	
Svartá	9	3910	lax	0,5	0,6	0,8	0,1	*		2,0
			bleikja	0,3	0,2	0,1				0,6
			urriði	0,1	*	0,1				0,2
Blanda	7	1380	lax	0,4	0,3	0,1				0,8
			bleikja	0,9	0,5	0,4	0,2			2,0
			urriði	0,2						0,2
Hlíðará	2	500	lax			1,8				1,8
			urriði			0,2				0,2
Auðólfssstaðaá	1	500	lax		0,2	1,4	0,4			2,0
			bleikja		0,4					0,4

* Fjöldi seiða undir 0,05 á 100 m²Tafla 2. Meðallengd ($\bar{L}$), meðalþyngd ($\bar{P}$), meðalholdastuðull ($\bar{K}$) og staðalfrávik (SF) á seiðum í Svartá 1993.

Aldur	Fjöldi	L	SF	P	SF	K	SF
0+	21	2,9	0,2				
1+	24	6,4	1,2	3,3	3,4	1,1	0,1
2+	32	9,2	0,6	8,8	1,8	1,1	0,1
3+	2	11,8	0,1	18,5	3,0	1,1	0,1
(4+	1	14,2		28,0			)

Tafla 3. Fjöldi, meðallengd, meðalþyngd og holdastuðull seiða í Svartá frá 1981-1993.

	1981	1983	1983	1984	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
	júlí		sept	júlí	sept									
Fjöldi														
alls	16,0	3,7	7,5	3,2	4,0	1,6	1,3	1,6	3,1	5,2	2,5	3,6	1,1	2,0
0+ seiða	3,8		1,1x			0,3	0,2	0,3	0,9	0,1	0,3	1,3	0,2	0,5
1+ seiða	9,7		0,4	0,7x	0,5	0,3	0,6	0,9	1,2	3,1	0,3	0,9	0,6	0,6
2+ seiða	2,3	0,7	3,1	0,6	0,6	0,2	0,2	0,4	1,0	1,7	1,5	0,3	0,3	0,8
3+ seiða	0,2	2,9	2,9	1,5	2,5	0,4	0,1	*	0,1	0,3	0,4	1,1		0,1
4+ seiða		0,1		0,4	0,4	0,2	0,1	*	*					
5+ seiða						0,1		*						
sl-seiða			x	x		0,1	0,1							
Meðallengd														
0+ seiða	3,5					3,8	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	3,7	3,1	2,9
1+ seiða	6,6					5,5	6,9	6,6	6,1	6,2	5,8	5,5	6,6	6,4
2+ seiða		7,1				8,0	8,8	9,7	9,4	8,7	8,7	8,0	8,2	8,6
3+ seiða		10,6				9,4	10,9	11,8		11,2	10,8	11,5	10,6	10,4
4+ seiði						11,4	12,7			12,6				
5+ seiði							14,6							
Meðalþyngd														
0+ seiða														
1+ seiða										2,2	1,8	3,5	2,7	3,3
2+ seiða										7,1	5,5	6,7	6,9	8,8
3+ seiða										13,7	17,6	15,2	12,1	18,5
Meðal-K														
0+ seiða														
1+ seiða										1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
2+ seiða										1,1	1,1	1,2	1,1	1,1
3+ seiða										1,1	1,1	1,3		1,1

Tafla 4. Hitafar í Svartá og Blöndu 1993.

Blanda við Ennisflúðir

	max	min	meðaltal
júní	12,9	3,7	8,2
júlí	13,1	6,4	9,1
ágúst	13,0	6,1	9,5
september (1-16)	11,4	7,2	9,6

Blanda við Eldjárnsstaði

	max	min	meðaltal
júní	10,5	3,2	7,0
júlí	12,1	6,1	8,7
ágúst	11,2	6,1	8,9
september (1-15)	10,6	7,9	9,2

Svartá við ármót


	max	min	meðaltal
júní	10,7	3,6	7,0
júlí	12,9	4,8	7,8
ágúst	12,3	4,0	8,4
september (1-15)	11,0	6,2	8,6

Svartá við Stafn


	max	min	meðaltal
júní	10,2	2,2	5,8
júlí	12,7	3,2	6,5
ágúst	12,1	1,9	6,9
september (1-15)	10,6	4,2	6,9

Blanda inntakslón

	max	min	meðaltal
apríl	0,3	0,1	0,2
maí	2,8	0,3	1,2
júní	9,9	2,6	6,7
júlí	11,2	7,8	9,1
ágúst	10,4	8,2	8,9
september	9,8	5,9	8,3
október	6,1	0,2	2,6



Mynd 1. Vatnakerfi Blöndu.




Mynd 2b. Rafveiði í Blöndu 1993. Stöðvar teknar í ágúst merktar frá A-C en stöðvar teknar í september merktar frá I-IV.

fjöldi


10

Stöð 1
200 m²




fjöldi

Stöð 2
250 m²




fjöldi

Stöð 3
400 m²




fjöldi

Stöð 4
400 m²




fjöldi

Stöð 5
500 m²




Mynd 3. Fjöldi, lengd og aldur laxaseiða í Svartá 1993.


fjöldi




fjöldi



fjöldi




fjöldi




frh. af mynd 3.

fjöldi




Mynd 4. Fjöldi, lengd og aldur laxaseiða, allar stöðvar, í Svartá 1993.

fjöldi




Mynd 5. Fjöldi, lengd og aldur bleikjuseiða, allar stöðvar, í Svartá 1993.

fjöldi




Mynd 6. Fjöldi, lengd og aldur urriðaseiða, allar stöðvar, í Svartá 1993.


fjöldi




fjöldi








fjöldi



fjöldi




Mynd 7. Fjöldi, lengd og aldur seiða í Blöndu 4/8 1993.




Mynd 8. Fjöldi, lengd og aldur seiða í Blöndu 15/9 1993.

fjöldi


Stöð IV
bleikja
400 m²

fjöldi


Stöð IV
urriði
400 m²

frh. af mynd 8.


fjöldi

lax
1380 m²

fjöldi


bleikja
1380 m²

fjöldi


urriði
1380 m²

Mynd 9. Fjöldi, lengd og aldur seiða í Blöndu, allar stöðvar, bæði frá 4/8 og 15/9 1993.

fjöldi




fjöldi




Mynd 10. Fjöldi, lengd og aldur seiða í Hlíðará 1993.


fjöldi




fjöldi




Mynd 11. Fjöldi, lengd og aldur seiða í Auðólfssstaðaá 1993.




Mynd 12. Hiti í Blöndu við Ennisflúðir 1993.




Mynd 13. Hiti í Blöndu við Eldjárnsstaði 1993.



Mynd 14. Hiti í Svartá við ármót 1993.



Mynd 15. Hiti í Svartá við Stafn 1993.



Mynd 16. Hiti í inntakslóni Blönduvirkjunar 1993.